# Phoska-sol® M.K.P 00.52.34
ENGRAIS SOLUBLES






**Formulation :** cristaux.

**Composition :**
- **Azote total (N) :** 0%.
- **Anhydride phosphorique ($P_2O_5$) :** 52 %.
- **Oxyde de potassium ($K_2O$) :** 34 %.

**Caractéristiques techniques et avantages :**
**Phoska-sol®** est un engrais soluble qui contient deux éléments : du phosphore et de la potasse.
**Phoska-sol®** est recommandé en fertigation et en nutrition foliaire.
**Phoska-sol®**contient très peu de chlorures (max 20 ppm) et de sodium (max 50 ppm) ce qui le recommande pour toutes les cultures sensibles au chlore et en culture hors sol. Son indice de salinité (8,4) est le plus faible de tous les autres sels utilisés comme engrais.
**Phoska-sol®** ne provoque pas l'obstruction des goutteurs et des tuyaux d'irrigation et ne laisse pas de résidus nocifs dans la solution ou dans le sol.

**Fertilisation foliaire :**
**Phoska-sol®** est un excellent moyen de fournir un supplément en P et K à la culture, à certains stades phénologiques où les besoins en PK sont importants.

**Doses recommandées :** en fertigation et apport au sol.

| Cultures | Dose/ha | Périodes d'application |
|---|---|---|
| Tomate sous serre | 350 kg | Repiquage - Fin du cycle |
| Tomate industrielle et plein champ | 500 kg | Repiquage - Fin du cycle |
| Melon /pastèque | 275 kg | Repiquage - Fin du cycle |
| Arbres fruitiers à pépins | 400 kg | Du début à la fin du cycle |
| Arbres fruitiers à noyaux | 400 kg | |
| Vigne de table | 350 kg | Du début à la fin du cycle |
| Agrumes | 410 kg | Du début à la fin du cycle |

Nous recommandons d'augmenter la dose de 20 % dans les conditions de sols légers ou sableux.
Pour la fertigation : mélanger 10 kg de produit dans 100 L d'eau.

**Compatibilité :**
**Phoska-sol®** peut être mélangé avec la plupart des produits phytosanitaires. Il est recommandé, toutefois, d'effectuer un test de compatibilité avant traitement.

بروفارت
PROFERT
4 Chemins 06000 Béjaia
Tél.:+ 213 (0) 34 10 25 31- Fax: + 213 (0) 34 10 22 30
E-mail: info@profert-dz.com - Web: www.profert.dz

# فوصكاصول® MKP 00.52.34
## الأسمدة الذائبة






**الصيغة :** بلورات.

**التركيب :**
- **أزوت كلي (N) :** 0 %.
- **أنيدريد فوسفوري ($P_2O_5$) :** 52 %.
- **أكسيد البوتاسيوم ($K_2O$) :** 34 %.

**الخصائص التقنية و الفوائد :**

**فوصكاصول®** سماد قابل للذوبان، يحتوي على عنصرين : الفوسفور و البوتاس.

**فوصكاصول®** يُنصح استعماله بالتسميد عبر أنظمة الري و التغذية الورقية.

**فوصكاصول®** يحتوي على كمية قليلة جدا من الكلوريد (20 ppm كأقصى حد) و الصوديوم (50 ppm كأقصى حد) لذا يُنصح استعماله على المحاصيل الحساسة للكلور و المحاصيل المزروعة خارج التربة. مؤشر الملوحة (8.4) هو الأكثر ضعفا من كل الأملاح الأخرى المستعملة كأسمدة.

**فوصكاصول®** لا يتسبب في انسداد المقطرات و أنابيب الري و لا يترك بقايا ضارة في المحاليل أو في التربة.

**التسميد الورقي:**

**فوصكاصول®** وسيلة ممتازة لتوفير كمية إضافية من الفوسفور (P) و البوتاسيوم(K) للمحصول في بعض المراحل الفينولوجية حيث تكون الإحتياجات جد معتبرة لهاذين العنصرين.

**الجرعة المنصوحة :** عن طريق التسميد عبر أنظمة الري و بالاضافة الى التربة.

| المحاصيل | الجرعة/هك | فترات الإستعمال |
|---|---|---|
| طماطم البيوت البلاستيكية | 350 كلغ | إعادة الغرس – نهاية الدورة الزراعية |
| الطماطم الصناعية و الحقلية | 500 كلغ | إعادة الغرس – نهاية الدورة الزراعية |
| البطيخ/ الدلاع | 275 كلغ | إعادة الغرس – نهاية الدورة الزراعية |
| التفاحيات | 400 كلغ | من بداية إلى نهاية الدورة الزراعية |
| اللوزيات | 400 كلغ | |
| عنب المائدة | 350 كلغ | من بداية إلى نهاية الدورة الزراعية |
| الحمضيات | 410 كلغ | من بداية إلى نهاية الدورة الزراعية |

ننصح بزيادة الجرعة بنسبة 20 % في الأتربة الخفيفة أو الرملية.

للتسميد عبر أنظمة الري: يجب مزج 10 كلغ من المنتوج في 100 ل من الماء.

**التلاؤم :**

**فوصكاصول®** يمكن مزجه مع معظم منتجات الحماية بالمبيدات الفلاحية. يُنصح القيام باختبار إمكانية التلاؤم قبل المعالجة.


4 طـرق 06000 بجاية
الفاكس : 30 22 10 34 (0) 213 +  -  الهاتف : 31 25 10 34 (0) 213 +
الموقع الإلكتروني : www.profert.dz-  البريد الإلكتروني : info@profert-dz.com
بروفـارت
PROFERT